

## HNOJIVO ES

NPK hnojivo roztokové; N.P.K 8,12,6

7,7 % N celkový, z toho	vodorozpustný celkový dusík	96 g/l
6,7 % N močovinový	vodorozpustný močovinový dusík	84 g/l
1,0 % N amonný	vodorozpustný amonný dusík	12 g/l
11,6 % P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	vodorozpustný oxid fosforečný	144 g/l
5,8 % K <sub>2</sub> O	vodorozpustný oxid draselný	72 g/l
0,5 % B	vodorozpustný bór v komplexu s monoetanolaminem	6,2 g/l

**Zvláštní pokyny pro používání:** Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin.

**Obsah balení:** 25 kg • 496 kg • 1240 kg (tj. 20 litrů • 400 litrů • 1000 litrů)

**Výrobce:** AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic

**Podmínky skladování:** Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v rozmezí -15 °C až +30 °C.

**Maximální množství vrstev při skladování:** Kanystry 20 litrů - 3 vrstvy • kontejner 400 a 1000 litrů - 2 vrstvy.

**Doba použitelnosti:** 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.

**Rozsah a způsob použití:** Hnojivo je určeno pro aplikaci ve všech plodinách.

Hektarová dávka: **5,0 kg/ha** (tj. 4 litry/ha)

### Při aplikaci dbáme těchto zásad:

- Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
- Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejítí rosy) nebo pozdně odpolední aplikace. Postřik krátce před deštěm nebo za deště není účinný.
- Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.
- Při přípravě postřikové jichy použijte k rozmíchání přípravku vodu do kategorie tvrdosti „středně tvrdá“.
- Připravenou postřikovou jichu za stálého míchání ihned aplikujeme až do úplného spotřebování.

### Doporučená aplikace

Plodina	Termín aplikace	Dávka hnojiva (l/ha)	Doporučená dávka vody (l/ha)
obilniny	odnožování až kvetení	4	120 – 400
olejní	2. list až kvetení	4	120 – 400
luskoviny	2. list až kvetení	4	120 – 400
okopaniny	2. list až uzavření porostu	4	120 – 400
kukuřice	od 2. listu	4	120 – 400
vinná réva	1. až 3. list vyvinut	4	150 – 800
ovocné plodiny	od počátku vývoje listů	4	300 – 800
zelenina	tvorba listů	4	150 – 600
chmel otáčivý	od 2. páru listů	4	1.500 – 2.000

FORTE gama obsahuje mimo uvedených živin též látky významně podporující jejich příjem a následnou využitelnost pro růst a vývoj rostliny.

Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku mísitelnosti. Hnojivo FORTE gama přidáváme jako poslední složku. Nikdy nevytvářejte tankmix z koncentrovaných složek!

**Obsah rizikových prvků v hnojivu nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.:**

(Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

### První pomoc:

**Při zasažení očí:** Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

**Požítí:** Vypít bezprostředně po požití 0,5 litru vlažné vody a vyhledat lékaře.

**Zasažení pokožky:** rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

### Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Zbytky přípravku (případně oplachovou vodu) shromážděte k opětovnému použití jako hnojiva.

Hnojivo se dodává balené.

**Výrobek je uváděn do oběhu v souladu s požadavky Nařízení (ES) 2003/2003 O hnojivech ze dne 13.10.2003 ve znění pozdějších předpisů. Výrobek odpovídá typu, uvedenému v odstavci C.2.1, Přílohy 1 Nařízení.**

AGRA servis: [www.agra.cz](http://www.agra.cz), tel.: +420 383 399 737

Datum výroby/číslo výrobní šarže: