

POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN

SANATEX VS

POMOCNÝ PROSTŘEDEK K OCHRANĚ RAN PO ŘEZU A/NEBO PO JINÉM MECHANICKÉM POŠKOZENÍ OVOCNÝCH, OKRASNÝCH A LESNÍCH DŘEVIN

VZHLEDA SLOŽENÍ: SANATEX VS je pasta hnědé (bilo-šedé) barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI:



SIGNÁLNÍ SLOVO: Varování

Bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí:

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Doplňující informace: EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

ÚČINNÁ LÁTKA/OBSAH: VINYL-ACETÁTOVÁ DISPERZE 450 g / kg
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 1532-1C
DRŽITEL REGISTRACE: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv, ČR
Obsažené nebezpečné látky: Hexamethylentetramin (methenamin) 2,5% (CAS: 100-97-0)

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

**Expozice ostatních skupin necílových organismů je vyloučena.
Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel.**

NÁVOD K POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	3) Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka
lesní dřeviny	ochrana ran po mechanickém poškození	0,5-1 kg /1 m ² ošetřené plochy		nátěr, postřik
okrasné dřeviny	ochrana ran po řezu, ochrana ran po mechanickém poškození	0,5-1 kg /1 m ² ošetřené plochy		nátěr, postřik
ovocné dřeviny	ochrana ran po řezu, ochrana ran po mechanickém poškození	0,5-1 kg /1 m ² ošetřené plochy		nátěr, postřik

BALENÍ: SANATEX VS se dodává v PP kbelcích o objemu 10 l a v HDPE dózách o objemu 1 litr a 2,5 litru.

ROZSAH POUŽITÍ:

Při ošetření poraněných stromů po řezu, po mechanickém poškození (těžba apod.) a po poškození zvěří (např. vyloukání) se prostředek aplikuje štětce, kartáčem nebo vhodným postřikovačem v průběhu celého roku. SANATEX VS může být aplikován i při teplotě těsně nad bodem mrazu.

APLIKAČNÍ POZNÁMKY:

SANATEX VS se používá zpravidla bez ředění, je mísitelný s vodou, ale zředěním se jeho účinnost podstatně snižuje. Před použitím důkladně promíchat.

při sanaci poraněných stromů zvěří, mechanickým poškozením při těžbě a úpravách korun stromů se SANATEX VS nanáší na poraněná místa štětce nebo kartáčem, popř. se nastříká – k postřiků jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a s vířivou tryskou.

- doporučuje se při plnění postřikovače procedit SANATEX VS sítím postřikovače,
- prostředek může být nanášen i na vlhký podklad při teplotě od +5°C, po nanesení ale musí zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.

DOBA POUŽITELNOSTI:

24 měsíců od data výroby při správném skladování v původních neporušených obalech. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh pod dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozboru přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

LIKVIDACE, ČISTĚNÍ:

Prázdné plastové obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 – 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin. Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídatkem saponátu nebo 3% ním roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý prostředek lze velmi těžko odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Zbytky prostředku se smísí s hořlavým materiálem (např. dřevěné piliny) a spálí se ve spalovně pro pevné látky.

SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA:

SANATEX VS se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od 5°C do 30°C, oddělených od skladů s potravinami a krmivými. Při skladování a dopravě nelze palety stohovat. SANATEX VS se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být SANATEX VS přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky s přihlédnutím na způsob aplikace. Ochranný oděv označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ (ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13688), vhodný prostředek na ochranu očí (ČSN EN 166), čepici se štítkem nebo klobouk, ochranné rukavice označené grafickou značkou / piktogramem pro chemická nebezpečí (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 374-1), pracovní nebo ochranná obuv (ČSN EN ISO 20346, ČSN EN ISO 20347). Při práci s přípravkem SANATEX VS je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

PRVNÍ POMOČ:

Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití prostředku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, pokud je postižený při vědomí. Postižený, který požil SANATEX VS nebo má oči zasažené tímto prostředkem, musí být dopraven k lékaři.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce bere záruku na kvalitu výrobku ve smyslu pro něho platné podnikové normy. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím prostředku.

OBJEM NÁPLNĚ: 1 litr

POUŽITELNĚ DO:
ČÍSLO ŠARŽE:



VYRÁBÍ: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 SPYTIHNĚV, www.torasro.cz, tel.: 577 943 002