

Pomocný prostředek - adjuvant WETCIT™

Adjuvant – smáčedlo pro zlepšení funkce insekticidů, akaricidů, fungicidů, herbicidů, pomocných prostředků a kapalných hnojiv; pro profesionální použití

Účinná složka: ethoxylované alkoholy 8,1 % w/w;

Další látky: pomerančový olej, dodecylbenzensulfonát sodný

Formulace: rozpustný koncentrát (SL)



Varování

H317: může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H332: Zdraví škodlivý při vdechování.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

P261A Zamezte vdechování par.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P502 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, aby jste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Neznečšťujte vody prostředkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody.

Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. Před použitím si přečtěte příložené pokyny.

Výrobce a držitel rozhodnutí o zápisu do úředního registru: Oro Agri International Ltd., Postbus 8, 9285 ZV Buitenpost, Nizozemsko

Distributor pro ČR: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel 545 218 156, www.biocont.cz

Číslo zápisu do úředního registru: 1749-1C

Balení: HDPE lahev 1 l, HDPE kanystr 5 l,

Použitelné do:

Číslo šarže:

Působení:

Prostředek WETCIT je adjuvant s penetračními vlastnostmi určený do tank mixu většiny přípravků na ochranu rostlin, pomocných prostředků a kapalných hnojiv pro použití v zemědělství, zahradnictví a péči o travnaté plochy. Při správném použití WETCIT příznivě ovlivňuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny, omezuje úlet postřiku. WETCIT také umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Při použití smáčedla WETCIT je možné snížit množství aplikační kapaliny.

Návod k použití:

Oblast použití	Účel použití	Dávkování	OL	poznámka
Všechny plodiny	Zlepšení vlastnosti aplikační kapaliny	0,1 – 0,2%	AT	TM kromě přípravků obsahujících rostlinné oleje a morforegulátory

AT jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nepotřebují.

Aplikace a mísitelnost:

WETCIT je určen pro tank mix s povolenými přípravky na ochranu rostlin, pomocnými prostředky a kapalnými hnojivy, kromě přípravků obsahujících rostlinné oleje a morforegulatorů. Použití a OL se řídí přípravkem, pomocným prostředkem či kapalným hnojivem, se kterým je WETCIT míchán. Řiďte se též pokyny uvedenými na etiketách produktů použitých pro TM. Předem ověřte reakci rostlin na ošetření na omezeném vzorku rostlin. V případě pochybností si vyžádejte informaci u výrobce. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy. WETCIT je aplikovatelný běžnými pozemními postřikovači a rosiči, které zajistí rovnoměrné dávkování. Dávka aplikační kapaliny je závislá na použitém přípravku na ochranu rostlin.

Příprava postřikové kapaliny: Dodržujte pokyny pro přípravu postřikové kapaliny daného přípravku. Naplňte tank asi na 90 % požadovaného množství postřikové kapaliny. Za stálého pomalého míchání přidejte potřebné množství WETCITu a doplňte vodou na požadované množství. Připravený naředěný roztok musí být spotřebován do 12 hodin.

Čistění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte čistou vodou. V případě čistících prostředků postupujte dle návodu k jejich použití. Pokud návod k použití pesticidu obsahuje odlišný způsob čištění aplikačního zařízení, dodržujte způsob uvedený v daném návodu.

Skladování: Skladujte v suchých a chladných místnostech při teplotě 5 až 25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním a tepelným zářením. Uchovávejte v originálním uzavřeném obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Doba skladovatelnosti je 2 roky od data výroby při správném skladování v původních neporušených obalech.

Likvidace obalů a zbytků: Zbytky postřikové jichy se naředí 1 : 5 vodou a bezzbytku vystříkají na ošetřovanou plodinu. Vypláchnuté obaly mohou být likvidovány jako komunální odpad. Použité obaly se dále nepoužívají. Kontaminované obaly a neupotřebitelné zbytky přípravku, resp. přípravky s prošlou záruční lhůtou se likvidují rovněž předáním do schválené spalovny.

Bezpečnostní opatření:

Při práci s prostředkem WETCIT používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), případně se použijí ochranné prostředky podle rizikovějšího přípravku v tank mixu směsí.

Ochrana hlavy a dýchacích orgánů: není nutná.

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.

Ochrana očí a obličeje: bezpečnostní ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166).

Ochrana těla: celkový ochranný oděv z text. materiálu (ČSN EN 14605+A1 nebo 13034+A1).

Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky (ČSN EN ISO 20346 nebo 20347) s ohledem na práci v zemědělství.

Při manipulaci s prostředkem, po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Při manipulaci s WETCIT tem nepoužívejte kontaktní čočky. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte. Poškozené OOPP je třeba urychleně vyměnit. Práce s pomocným prostředkem je nevhodná pro alergické osoby, zakázána pro těhotné a kojící ženy a mladistvé.

První pomoc:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku či příbalového letáku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. Další další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Při nadýchání: Přerušete expozici, přejděte mimo ošetřovanou oblast

Při zasažení kůže: Odstraňte zasažený oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem

Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky a při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou po dobu 10 minut a poté neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc

Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení.