

BLOK: VOLITELNÉ OZNAČENÍ**WUXAL® SUSPENSION Boron****BLOK: POVINNÉ OZNAČENÍ**

HNOJIVO ES

Hnojivo NP – suspenzní 8-10 se stopovými živinami pro listovou výživu

Obsah živin:

% hmotnostní	živina
8,0 %	Dusík - celkový (N)
5,5 %	amonný ()
2,5 %	močovinový dusík ()
10,0 %	oxid fosforečný (P2O5)
7,0 %	bor (B)
0,05 %	měď (Cu) v chelátu s EDTA
0,1 %	železo (Fe) v chelátu s EDTA
0,05 %	mangan (Mn) v chelátu s EDTA
0,001 %	molybden (Mo)
0,05 %	zinek (Zn) v chelátu s EDTA

Množství: čistá hmotnost 13,5 kg (10 L)**Výrobce:** AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdtter Landstr. 199, D-40549 Düsseldorf, Německo.**Zvláštní pokyny pro použití:**

Vysoce koncentrované listové hnojivo obsahující bor pro použití v plodinách se zvýšenými nároky na bór, jako jsou cukrovka, řepka olejka, kukuřice, slunečnice, ovocné dřeviny, réva vinná a zelenina.

Wuxal SUS Boron je suspenzní hnojivo s vysokým obsahem boru, obsahující dusík, fosfor a plně chelatizované stopové prvky. Wuxal SUS Boron je určen jak pro preventivní použití, tak i k zabránění akutního nedostatku boru. Je velmi vhodný k léčení stresových stavů zemědělských plodin.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

BLOK VOLITELNÉ OZNAČENÍ**Dávkování a podmínky používání:**

plodina	dávka	poznámka
Cukrovka – srdéčková hniloba, zvýšení cukernatosti	2-5 l/ha	2 aplikace 1. Fáze 4-6 listů 2. Krátce před uzavíráním
Řepka olejka – zvýšení násady šešulí a semen, zvýšení obsahu oleje	2-5 l/ha	2 aplikace 1. Prodlužování růst 2. Tvorba poupat až počátek květu
Kukuřice – zvýšení výnosu a kvality	2-3 l/ha	1-2 aplikace 1. Fáze 4-5 listů 2. Fáze 7-9 listů
Jádroviny – zlepšení opálení a násady plodů	1-2 l/ha	3 aplikace 1. Během květu 2. Po odkvětu, do 3-4 týdnů (plody velikosti lískového oříšku až vlašského ořechu)
Peckoviny - zlepšení opálení a násady plodů	2-3 l/ha	2 aplikace 1. Počátek plného květu 2. Po sklizni
Réva vinná – sprchání květů, lepší opylení	2 l/ha	2 aplikace 1. 2-3 týdny před květem 2. těsně před květem
Zelenina (zejména brukvovitě, mrkev, celer, fazol, hrách, ředkvička, salát aj.) – zvýšení kvality	2-3 l/ha	2-3 aplikace 1. Obecně: 2-3 týdny po výsadbě či vzejití a opakovat po 8 – 10 dnech 2. Brukvovitě: ve stadiu 4-6 listů a počátkem tvorby hlávky

Mísitelnost:

Wuxal SUS Boron je mísitelný s běžně používanými pesticidními přípravky. V každém případě však doporučujeme provést předem před prvním použitím pro zvýšení jistoty test na mísitelnost. Wuxal SUS Boron není mísitelný s Wuxalem SUS Kalcium a Wuxalem Aminocal. Wuxal SUS Boron dále nelze mísit s minerálními oleji, síranem zinečnatým, síranem manganatým a látkami vykazujícími alkalickou reakci! Příprava aplikačního roztoku.

Při ředění je nutno zachovávat následující postup.

1. Hnojivo je předem nutno v obalu dokonalým promícháním homogenizovat.
2. Do nádrže dát cca. $\frac{3}{4}$ množství vody.
3. Zapnout míchání.
4. Přidat odměřené množství přípravku. Pečlivě vypláchnout obal a přidat do nádrže.
5. Poté eventuelně přidat další typ hnojiva typu Wuxal.
6. Poté eventuelně přidat pesticidní přípravky.
7. Nádrž doplnit vodou na stanovený objem.
8. Připravenou jichu je nutno co nejrychleji vystříkat, nelze ji připravovat do zásoby.

Pokyny pro skladování a manipulaci:

Přípravek je třeba skladovat v dobře uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte produkt před znečištěním, vyschnutím, teplotami pod $+5^{\circ}\text{C}$ a nad $+40^{\circ}\text{C}$, a obaly před mechanickým poškozením. Zabránit většímu kolísání teplot. Účinkem příliš nízkých či příliš vysokých teplot může dojít ke změně barvy přípravky a jeho krystalizaci. Eventuelně vytvořené krystaly se však snadno rozpustí při přípravě jichy a nejsou na závadu jakosti výrobku. V případě přebalování hnojiva nepoužívat kovové obaly – nebezpečí koroze.

BLOK: DODATEČNÉ OZNAČENÍ

Pouze pro profesionální uživatele.



Nebezpečí

Obsahuje kyselinu boritou.

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

Před použitím si obzarejte speciální instrukce.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Při používání nejezte a nepijte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti výparům/aerosolům a v případě vytvoření vlhké mlhy. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Opatření při požáru:

Materiál sám o sobě není nebezpečný a také sotva vznítitelný. V případě okolního ohně se mohou uvolnit nebezpečné zplodiny. V případě že se v ohni nachází větší množství hnojiva můžou se tvořit plyny dusíku, amoniaku a kyseliny fosforečné. Eventuelní požár je možné hasit postříkáním vodou, oxidem uhličitým, chemickou hasební pěnou, chemickým hasebním práškem. Vodu lze použít pro chlazení obalu ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu.

První pomoc:

Projevili-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání aerosolu při aplikaci:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě : 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: AGRO ALIANCE, s.r.o. 252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 137-8